

- | | |
|--|---|
| <p>6. Head larger. Flowers earlier than <i>E. pusillus</i>, that is, maturing in fruit when the latter is still in full anthesis.</p> <p>7. Involucral bract larger in size, not tinged with a purplish spot, coarsely hairy on the back in a line, where there is very rarely an interrupted purplish streak.</p> <p>8. Number of florets per head of a normal or a little smaller size 41-65, including 10-18 hermaphrodite flowers.</p> <p>9. Limb of corolla tube subacute oblong, corolla tube slightly constricted below the limb.</p> <p>10. At the tip on the inner side of the limb, a group of long papillae are projected inwards.</p> <p>11. Papillae of the styler arms strongly swollen at base.</p> | <p>6. Head smaller. Later in flowering.</p> <p>7. Smaller in size, tinged with a purplish spot at or just below the apex, not hairy on the back.</p> <p>8. 31-47, including 6-9 hermaphrodite flowers.</p> <p>9. Obtuse triangular, broader and shorter than the preceding, corolla tube not at all constricted.</p> <p>10. A pile of orbicular papillae at the tip inside.</p> <p>11. Not so strongly swollen at base.</p> |
|--|---|

The following different topics concerns the weeds belonging to *Coenotus*, but may worth to be mentioned. However the problem of the distribution of these weeds are not the main theme of this note. I will not go on further. *E. floribundus* (H. B. K.) Sch. Bip. (= *E. musashiensis* Makino in Journ. Jap. Bot. **3**: 31, 1926) is flourishing as weed even as north as Prov. Echigo, while *E. bonariensis* L. is now declining around Tokyo and elsewhere in Japan.

○アラゲヒョウタンボクの無毛変種 (大井次三郎) Jisaburo OHWI: A glabrous variety of *Lonicera strophophora* Franch.

アラゲヒョウタンボクは、北海道から本州の山地に余り多くはないが時々見かけるもので、この類の中では苞が大きいので割合ははっきり区別される。成葉の両面、特に下面脈上には開出した粗毛があるが、古く笹村祥三氏は葉の両面に毛のなくなった形のものを採集されて、下記の名をつけてあったが、未発表のままになっていた。今回国立科学博物館で“日本列島の自然”を調査に当って、陸中五葉山に採集し、新しい材料を得ら

れたので、ここに記録する。この形のもはこの付近の特産ではないかと思われる。この稿を書くに当って笹村祥三氏、小山滋博氏、堀田満氏、福岡誠行氏の方々に感謝する。タイプは国立科学博物館におく。

Lonicera strophiphora Franch. var. **glabrifolia** Ohwi, var. nov.

Folia plus minus tenuiora, adulta margine parce ciliata, utrinque glabra.

Hab.: Honshu: Prov. Rikuchu: Goyozan-rindo to Goyozan-shrine in Mt. Goyozan, about 850–1000 m., June 24, 1967, leg. H. Koyama et M. Hotta, No. 2287, typus in TSM: Ohmatsu-route in Mt. Goyozan, about 400–1100 m., leg. H. Koyama et S. Sasamura, No. 2541. Mt. Goyozan, leg. S. Sasamura, May 10. 1964. and May 25, 1964.

○ホザキイチヨウランの記事に関する訂正 (水島正美) Masami MIZUSHIMA: Correction of my version on *Malaxis monophyllos* Sw.

本誌42巻5月号の159–160頁に、ホザキイチヨウランの花の唇弁が個体により上位と下位とがあることを述べた。その文末にうかつにも学名を *Malaxis monophyllos* とすべしと書いてしまった。これはヤチランと別属に見る場合、命名規約からは誤りであって、従来通りに ***Microstylis monophyllos*** Lindley とせねばならない。属名 *Microstylis* (Nutt.) Eaton は1956年出版の万国植物命名規約の231頁に属保留名として公表されており、これを見落していたのは筆者の疎漏であった。同時にヤチランも従前通り *Malaxis paludosa* Sw. で良いことになり、両種を同属に扱う時にはホザキイチヨウランを *Malaxis monophyllos* Sw. と呼べば良い。保留名について御注意下さった東大の原教授及びお茶の水大の津山教授に御礼申し上げます。

頁 (Page)	行 (Line)	正 誤 (Errata)	
		誤 (For)	正 (Read)
159	28	<i>monophylla</i>	<i>monophyllos</i>
160	13	a fossil areas	fossil areas
229	34, 35		削除
272	2, 4, 27, 30	Müell	Müll
"	13	6306	6309
273	1, 34	Müell	Müll
274	14, 29, 30	Müell	Müll
275	21, 32	1844	1845
276	2	1844	1845